

## 癌化学療法輸液約束処方 大3

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大3 IRIS

| 薬品名（商品名） | 一般名              | 略号     | 標準投与量                 | 投与方法     | 投与経路       | 投与日            | 1コースの期間 |
|----------|------------------|--------|-----------------------|----------|------------|----------------|---------|
| ティ・エス・ワン | ギメラシル・オテラシル・テガフル | TS-1   | 80 mg/m <sup>2</sup>  | 分2 朝・夕食後 | PO         | DAY 1(夕)～15(朝) | 28日間    |
| イリノテカン   | 塩酸イリノテカン         | CPT-11 | 100 mg/m <sup>2</sup> | 90分      | CVポートor 末梢 | DAY 1, 15      |         |

### DAY 1

#### 【 CVポートor末梢 】

- ① NS 50ml + デキサート 1V / 5分
- ② NS 50ml + アロキシ 1V / 5分
- ③ NS 500 ml + イリノテカン mg / 90分
- ④ NS 50ml / 5分

#### 【備考】

- ① IRIS 療法は FIRIS 試験により FOLFIRI との非劣性が証明されている。
- ② 総コース数の制限:なし。
- ③ H26.5.16 Dr.丸山の指示にて CPT-11+TS-1 biw から IRIS に内容変更。

### \* 注意事項

- ① TS-1はDAY 1の夕食後より内服開始する。

#### 【TS-1の休薬基準】

|         |            |
|---------|------------|
| 好中球     | 1000未満     |
| 血小板数    | 7.5万未満     |
| 血清Cre   | 1.5mg/dL以上 |
| 感染      | 38°C以上の発熱  |
| 下痢      | Grade 2以上  |
| 粘膜炎/口内炎 | Grade 2以上  |

H26.5.16 作成