

癌化学療法輸液約束処方

癌種 大腸癌 再発・切除不能（入院）

レジメン名 大5 m-FOLFOX 6

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量
レボホリナートCa	レボホリナートCa	I-LV	Ⓐ200mg/m ²
エルプラット	オキサリプラチン	L-OHP	Ⓑ85mg/m ²
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓒ400mg/m ²
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓓ800~1200mg/m ²
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓔ800~1200mg/m ²

IVH

IVHポート用

IVH側管

- DAY1 {
- ① 5%TZ50ml+デキサート1V / 15min
 - ② 5%TZ50ml+グラニセトロン1A / 15min
 - ③ 5%TZ250ml+ エルプラット Ⓑ mg / 120min ④開始時
 - ④ 5%TZ500ml+ フルオロウラシル Ⓓ mg / 22hr 5%TZ50ml+
- DAY2 {
- ⑤ 5%G500ml+ フルオロウラシル Ⓔ mg / 24hr
 - ⑥ NS50ml / 5min

レボホリナートCa Ⓐ×1

オキサリプラチンⒷ×1 TC

フルオロウラシル(bolus) Ⓒ×1

フルオロウラシル(continuous)

Ⓔ 800mg

Ⓓ+Ⓔ TO

大5

投与時間	投与経路	投与日	投与期間
mg/body for120min	末梢	DAY1	every 2week
mg/body for120min	IVH	DAY1	every 2week
mg/body bolus iv	IVH側管	DAY1	every 2week
mg/body for22hr	IVH	DAY1	every 2week
mg/body for24hr	IVH	DAY2	every 2week

末梢

③と同時

フルオロウラシル ① mg } 5%TZ250ml + レボホリナート ④ mg / 120min
 } 5 NS50ml / 5min → 抜針せず

DAY2
 朝AM6:00~ { NS50ml + デキサート 1V / 5min
 { NS50ml + カイトリル1A / 5min
 { NS50ml / 5min

TOTAL 200mg/m² _____ mg/body

TOTAL 85mg/m² _____ mg/body

TOTAL 400mg/m² _____ mg/body

⑤ 800mg~1200mg/m² _____ mg/body

⑥ ~1200mg/m² _____ mg/body

TOTAL 1600mg~2400mg/m² _____ mg/body