

がん化学療法輸液約束処方 子頸2

癌種 子宮頸癌(腺癌)
登録No. 子頸2 MEP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	点滴時間	投与経路	投薬期間	1クール期間
マイトマイシンC	マイトマイシン	MMC	10 mg/m ²	30分	点滴注射	DAY 1	28日間
ペブシド	エトポシド	ETO	100 mg/m ²	120分		DAY 1, 3, 5	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	50 mg/m ²	120分		DAY 1	

- 【 DAY 0 】 21:00～6:00 ① テルモ生食 1000ml / 9時間
- 【 DAY 1 】 6:00～9:00 ① NS 500ml + ファモチジン 1V + ホスホマイシンNa 2g / 3時間
 9:00～10:00 ② NS 250ml + デキサート2V / 1時間
 10:00～10:30 ③ NS 100ml + ラモセトロン 1A / 30分
 10:30～12:30 ④ NS 350ml + シスプラチン mg / 2時間
 12:30～13:30 ⑤ NS 250ml + 8.4%メイロン 20ml + メトクロプラミド 1A / 1時間
 13:30～15:30 ⑥ NS 500ml + エトポシド mg / 2時間 *PVCフリーライン フィルターなし
 15:30～16:00 ⑦ NS 50ml + マイトマイシンC mg / 30分
 16:00～18:30 ⑧ NS 500ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシンNa 2g / 2.5時間
 18:30～19:00 ⑨ NS 50ml + ラモセトロン1A / 30分
 19:00～22:00 ⑩ NS 500ml + 8.4%メイロン 20ml + メトクロプラミド 1A / 3時間
 22:00～2:00 ⑪ ビカネイト 1000ml / 4時間
- 【 DAY 2 】 2:00～7:00 ① NS 500ml / 5時間
 7:00～12:00 ② ソリューゲンF 500ml + デキサート1V / 5時間
 9:00～9:30 ③ 側)NS 50ml + ラモセトロン1A / 30分
 12:00～17:00 ④ ソルデム3A 500ml + ファモチジン 1A + ネオファーゲン 1A + タチオン 1A / 5時間
 17:00～22:00 ⑤ ソリューゲンF 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 5時間
- 【 DAY 3 】 6:00～9:00 ① ソリューゲンF 500ml + デキサート1V / 3時間
 9:00～10:30 ② NS 250ml + 8.4%メイロン 20ml / 1.5時間
 10:30～11:00 ③ NS 100ml + ラモセトロン1A / 30分
 11:00～13:00 ④ NS 500ml + ペブシド mg / 2時間 *PVCフリーライン フィルターなし
 13:00～16:00 ⑤ ソルデム3A 500ml + ネオファーゲン 1A + ファモチジン 1V / 3時間
 16:00～16:30 ⑥ NS 100ml + ラモセトロン1A / 30分
 16:30～19:00 ⑦ ソリューゲンF 500ml / 2.5時間
 19:00～22:00 ⑧ ソルデム3A 500ml / 3時間
- 【 DAY 4 】 9:00～12:00 ① ソリューゲンF 500ml + タチオン 1A + ネオファーゲン 1A / 3時間
 12:00～15:00 ② ソルデム3A 500ml + ファモチジン 1A + デキサート0.5 V / 3時間
 15:00～18:00 ③ ソリューゲン500ml / 3時間
 18:00～21:00 ④ ソルデム3A 500ml / 3時間
- 【 DAY 5 】 DAY 3と同じ
 【 DAY 6 】 DAY 4と同じ