

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： BRST-113

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
乳がん	TC療法	21日間	4コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	J Clin Oncol 24: 5381-, 2006

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート アロキシ 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	5分	↓																				
②	ドセタキセル 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓																				
③	エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴静注	30分	↓																				
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

<注意事項/備考>

- ✓ DTX：粘調性高 → 調製時注意
- ✓ TC療法の適応 → 基本的にはアンスラサイクリン含有レジメン使用不可の場合
- ✓ 術後/術前化学療法の場合：4コースが目安
- ✓ 浮腫（DTX）：総投与量350-400mg/m²以上で頻度上昇。足のむくみなどの症状に注意、予防のためのDEX内服も検討
- ✓
- ✓