# 【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： BRST-121

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 | 催吐リスク | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳がん | triweekly Nab-PTX | 21日間 | 規定なし | ■ 進行/再発<br>□ 術後補助化学療法<br>□ 術前補助化学療法<br>□ 放射線併用化学療法<br>□ その他 | 軽度 | J Clin Oncol 23: 7794-7803, 2005 |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | アブラキサン<br>生理食塩液 | 260mg/㎡<br>適量 | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

＜注意事項/備考＞

✓ nab-PTX：特性生物由来製品➔使用記録（氏名、住所、使用年月日、製造番号）を20年間保管
✓ nab-PTX：インラインフィルター使用禁（フィルターへのアルブミンタンパク吸着の可能性あり）
✓ nab-PTX：アルコールを含まないため、アルコール過敏症のある場合も使用可能
✓ 末梢神経障害（nab-PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
✓
✓