日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科



NEWS LETTER Vol. 12

リンパ浮腫と眼瞼下垂症

正常

リンパダ腫

以前より行っていましたが、人員が足りず院外からの紹介をお受 けできていなかった範囲を、人員増強によりお受けしていくことにな りました。

リンパ浮腫(担当:久保村)、眼瞼下垂症(担当:有馬・金子)の患 者さんがいらっしゃったらいつでもご紹介ください。



5.4 F


リンパ管吻合を強化します

乳がん、子宮頸がん・体がん、前立腺がんなどの手 術(リンパ節郭清術)後や、抗がん剤治療中にリンパ 流が滞ることがあり、リンパ浮腫の原因となります。

> 月・金外来で拝見 いたします



圧迫療法のやりづらい陰部の浮腫がある場合や、蜂 窩織炎を繰り返している場合はリンパ管静脈吻合等 の手術療法の良い適応と考えられています。



眼瞼下垂手術を 形成外科で再開します

眼瞼下垂症は、有馬講師、金子医師が専門で対応 させて頂きます。まぶたが重い症状がある方は気軽 に外来にお越しください。





有馬医師・金子医師が拝見いたします。 電話でご予約お願いいたします



眼瞼下垂症手術の合併症で大きな問題となるは術後 の出血です。外来通院で手術も可能ですが、合併症を 減らすため、術後数日の入院にも対応しています。