

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無斷轉載禁止》

レジメン番号: GAST-110

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
胃がん	DOC+S-1	21日間	【進行/再発】 規定なし 【術後】 計1年間	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	J Cancer Res Clin Oncol 140: 319-28, 2014 J Clin Oncol 37: 1296-1304, 2019

＜注意事項/備考＞

- ✓ S-1投与量：BSA<1.25m²：80mg/day、1.25≤BSA≤1.5m²：100mg/day、BSA>1.5m²：120mg/day
 - ✓ S-1：他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける） / 空腹時の内服は避ける（抗腫瘍効果減弱の可能性）
 - ✓ 浮腫（DOC）：総投与量350-400mg/m²以上で頻度上昇。足のむくみなどの症状に注意、予防のためのDEX内服も検討
 - ✓
 - ✓