

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無斷轉載禁止》

レジメン番号： GAST-124

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
胃がん	SOX	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	N Engl J Med 358: 36-46, 2008 Ann Oncol 26: 141-8, 2015

＜注意事項/備考＞

- ✓ L-OHPの承認用量は130mg/m²だが、国内G-SOX試験の設定用量は100mg/m²（PLT低下注意）
 - ✓ S-1投与量：BSA<1.25m²：80mg/day、1.25≤BSA≤1.5m²：100mg/day、BSA>1.5m²：120mg/day
 - ✓ S-1：他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける） / 空腹時の内服は避ける（抗腫瘍効果减弱の可能性）
 - ✓ S-1の内服タイミング：Day1の夕食後からDay15の朝食後まで
 - ✓ 過敏症（L-OHP）：7-8コース前後で頻度上昇、症状は呼吸苦、かゆみ、発赤など

✓ 末梢神経障害 (L-OHP) : 急性 (寒冷刺激で誘発) と慢性 (知覚異常を伴う機能障害、総投与量850mg/m²より頻度上昇)