

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： GAST-125

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
胃がん	RAM+wPTX	28日間	規定なし	☒ 進行/再発 ☐ 術後補助化学療法 ☐ 術前補助化学療法 ☐ 放射線併用化学療法 ☐ その他	軽度	Lancet Oncol 15: 1224-35, 2014

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート ファモチジン ポラミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓							↓						↓														
②	サイラムザ 生理食塩液	8mg/kg 250mL(全量)	点滴静注	60分	↓													↓														
③	生理食塩液	100mL	点滴静注	60分*	↓													↓														
④	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓							↓						↓														
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓						↓														
* 初回のみ生理食塩液100mLを1時間かけて投与（経過観察時間）、2コース目以降は、生理食塩液50mLを5分間かけて投与																																

＜注意事項/備考＞

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
- ✓ RAM：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓ RAM：全量250mLに調製し、60分かけて投与（投与速度は25mg/minを超えない）

✓ RAM：尿蛋白2+ → 定量検査を / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）