

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

«無断転載禁止»

レジメン番号： GAST-132

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
胃がん	mFOLFOX6 (Gastric Cancer)	14日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	J Clin Oncol 26: 1435-44, 2008 JAMA Oncol 3: 620-27, 2017 Ann Oncol 27: 2196-203, 2016

	薬品名	投与量	投与 経路	投与 時間	Day									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	テキサート パロノセトロン アロカリス	6.6mg 0.75mg/50mL 235mg	点滴静注	30分	↓									
②	レボホリナート* 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	120分	↓									
③	エルプラット* 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注 (側管)	120分	↓									
④	5-FU 5%ブドウ糖液	400mg/m ² 50mL	点滴静注	5分	↓									
⑤	5-FU 生理食塩液	2400mg/m ² 適量	点滴静注	46時間		→								
*②と③は同時に2時間かけて投与														

<注意事項/備考>

- ✓ 原則として、皮下埋め込みポートより投与
- ✓ オキサリプラチンはレボホリナートの側管から同時に投与
- ✓ 相互作用：フェニトイン、ワルファリンなどとの併用で、5-FUの血中濃度上昇の可能性
- ✓ 過敏症（L-OHP）：7-8コース前後で頻度上昇、症状は呼吸苦、かゆみ、発赤など
- ✓ 末梢神経障害（L-OHP）：急性（寒冷刺激で誘発）と慢性（知覚異常を伴う機能障害、総投与量850mg/m²より頻度上昇）

✓