

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無斷転載禁止》

レジメン番号 : RCC-114


対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
腎細胞がん	Pembrolizumab + Axitinib	21日間 or 42日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	N Engl J Med 380: 1116-27, 2019

〈注意事項/備考〉

- ✓ Pembrolizumab : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与
 - ✓ 間質性肺炎：初期症状は息切れ、発熱、咳嗽（空咳）など。胸部X線検査やSPO2モニタリング等で定期的にモニタリングを
 - ✓ 血糖上昇：口渴、多飲、多尿、倦怠感などの症状に注意。来院時には血糖の測定を
 - ✓ 大腸炎、下痢：持続する腹痛、嘔吐、下痢、血便など
 - ✓ 甲状腺機能障害：投与中は定期的にTSH、FT3、FT4などの検査を

✓ Axitinib：患者の状態により適宜増減、1回10mgを1日2回まで增量可

:»



42

↓ ↓



_