

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無斷転載禁止》

レジメン番号： CRC-109

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
大腸がん	UFT/LV	35日間	【進行/再発】 規定なし 【術後補助】 6か月	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	J Clin Oncol 20: 3605-, 2002 J Clin Oncol 20: 3617-, 2002 J Clin Oncol 24: 2059-, 2006

〈注意事項/備考〉

- ✓ UFT投与量：BSA<1.17m²：300mg/day、1.17≤BSA≤1.49m²：400mg/day、1.50≤BSA≤1.83m²：500mg/day、BSA>1.83m²：600mg/day
 - ✓ 他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける）
 - ✓ 術後補助化学療法の場合：6ヶ月（5コース）が目安
 - ✓ UFT：食事の前後1時間を避けて（空腹時）内服 → 食後投与によりウラシルおよびテガフルから変換されたフルオロウラシルのAUC減少のため
 - ✓

✓

->



35



_