

【日本医科大学附属病院 がん化学療法レジメン】

※無断転載禁止

レジメン番号： CRC-149

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 | 催吐リスク | 根拠 |
|----------------------------|---------------------------|-------|-------|---|-------|---------------------------------|
| 大腸がん (EGFR陽性 およびRAS野生型) | Cmab + FOLFIRI (隔週投与法) | 14日間 | 規定なし | <input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | 中 | N Engl J Med 360: 1408-17, 2009 |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ① | デキサート ポララミン 生理食塩液 | 6.6mg 5mg 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ② | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ③ | アービタックス 生理食塩液 | 500mg/m ² 250mL | 点滴静注 | 初回 120分 2回目～60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | アロカリス デキサート パロノセトロン | 235mg 6.6mg 0.75mg/50mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | レボホリナート* 5%ブドウ糖液 | 200mg/m ² 250mL | 点滴静注 | 120分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | イリノテカン* 5%ブドウ糖液 | 150mg/m ² 250mL | 点滴静注 (側管) | 90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ | 5-FU 5%ブドウ糖液 | 400mg/m ² 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ | 5-FU 生理食塩液 | 2400mg/m ² 適量 | 点滴静注 | 46時間 | —→ | | | | | | | | | | | | |

*⑦と⑧は同時に投与

＜注意事項/備考＞

- ✓ Cmab：初回は2時間かけて投与、2回目以降は1時間かけて投与
- ✓ Cmab投与後の経過観察時間について：経過によっては省略可（生食50mL 5分に変更） / 定期的な血中Mg値のモニタリングを（適宜Mg補正を）
- ✓ インフュージョンリアクション（Cmab）：初回から2回目に発現することが多い。悪寒、発熱、呼吸困難など。必要に応じて抗ヒスタミン薬やステロイド剤の投与
- ✓ ざ瘡様皮疹（Cmab）：比較的早期から生じる。スキンケアや保湿剤で予防を。必要に応じてステロイド剤の使用
- ✓ 爪巣炎（Cmab）：遅発性（1か月後～）に生じることが多い。疼痛、爪の発達障害など。洗浄を行い、必要に応じてテーピングや外用ステロイド剤を

:>



4

