

## レジメン番号：HNC-115

| 対象疾患  | レジメン名称              | コース期間              | 総コース数          | 適応  | 催吐リスク | 根拠                        |
|-------|---------------------|--------------------|----------------|---|-------|---------------------------|
| 頭頸部がん | Pembrolizumab<br>単剤 | 21日間<br>or<br>42日間 | 規定なし<br>(24ヶ月) | ■ 進行/再発<br>□ 術後補助化学療法<br>□ 術前補助化学療法<br>□ 放射線併用化学療法<br>□ その他 | 最小度   | Lancet 394: 1915-28, 2019 |

|               | 薬品名             | 投与量                | 投与経路 | 投与時間 | Day |   |   |    |    |  |  |  |
|---------------|-----------------|--------------------|------|------|-----|---|---|----|----|--|--|--|
|               |                 |                    |      |      | 1   | 2 | ~ | 20 | 21 |  |  |  |
| 【3週間隔で投与する場合】 |                 |                    |      |      |     |   |   |    |    |  |  |  |
| ①             | 生理食塩液           | 50mL               | 点滴静注 | 5分   | ↓   |   |   |    |    |  |  |  |
| ②             | キイトルーダ<br>生理食塩液 | 200mg/body<br>50mL | 点滴静注 | 30分  | ↓   |   |   |    |    |  |  |  |
| ③             | 生理食塩液           | 50mL               | 点滴静注 | 5分   | ↓   |   |   |    |    |  |  |  |

|               | 薬品名             | 投与量                | 投与経路 | 投与時間 | Day |   |   |    |  |  |  |  |
|---------------|-----------------|--------------------|------|------|-----|---|---|----|--|--|--|--|
|               |                 |                    |      |      | 1   | 2 | ~ | 41 |  |  |  |  |
| 【6週間隔で投与する場合】 |                 |                    |      |      |     |   |   |    |  |  |  |  |
| ①             | 生理食塩液           | 50mL               | 点滴静注 | 5分   | ↓   |   |   |    |  |  |  |  |
| ②             | キイトルーダ<br>生理食塩液 | 400mg/body<br>50mL | 点滴静注 | 30分  | ↓   |   |   |    |  |  |  |  |
| ③             | 生理食塩液           | 50mL               | 点滴静注 | 5分   | ↓   |   |   |    |  |  |  |  |
|               |                 |                    |      |      |     |   |   |    |  |  |  |  |
|               |                 |                    |      |      |     |   |   |    |  |  |  |  |
|               |                 |                    |      |      |     |   |   |    |  |  |  |  |
|               |                 |                    |      |      |     |   |   |    |  |  |  |  |

## &lt;注意事項/備考&gt;

- ✓ Pembrolizumab : 0.2または0.22  $\mu$ mのインラインフィルターを用いて投与
- ✓ 間質性肺炎：初期症状は息切れ、発熱、咳嗽（空咳）など。胸部X線検査やSPO2モニタリング等で定期的にモニタリングを
- ✓ 血糖上昇：口渴、多飲、多尿、倦怠感などの症状に注意。来院時には血糖の測定を
- ✓ 大腸炎、下痢：持続する腹痛、嘔吐、下痢、血便など
- ✓ 甲状腺機能障害：投与中は定期的にTSH、FT3、FT4などの検査を



✓

---

:>



42



—