

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

『無断転載禁止』

レジメン番号： BRST-123

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
乳がん	Bv + wPTX	28日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	N Engl J Med 357: 2666-76, 2007 Breast Cancer Res Treat 129: 829-38, 2011

〈注意事項/備考〉

- ✓ 【ポイント】PTX単剤と比較した際のOSの改善は示されていない（PFSの延長のみ）
 - ✓ PTX：0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
 - ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
 - ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
 - ✓ Bv：出血、創傷治癒遅延あり、原則として術後4週間は投与せず / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）

✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与

⇒

—