

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無斷転載禁止

レジメン番号： BRST-129

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
乳がん (HER2陽性)	PER + HER + Eribulin	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	The Breast 35: 78-84, 2017

### 〈注意事項/備考〉

- ✓ PER：初回のみ840mgを60分かけて投与、2回目以降は420mgを30分かけて投与
  - ✓ HER：初回8mg/kgを90分かけて投与、2回目以降は6mg/kgを30分かけて投与
  - ✓ 心障害：投与中は心エコー等を用いて心機能評価を
  - ✓ インフュージョンリアクション：悪寒、発熱、呼吸困難など。状況に応じて抗ヒスタミン薬や解熱鎮痛薬などの投与を検討
  - ✓ 末梢神経障害（Eribulin）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり

✓

---

:»

—