

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

『無断転載禁止』

レジメン番号： BRST-133

| 対象疾患 | レジメン名称           | コース期間 | 総コース数 | 適応                                                                                                                                                                                                   | 催吐リスク | 根拠                            |
|------|------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 乳がん  | dose-dense PTX療法 | 14日間  | 4コース  | <input type="checkbox"/> 進行/再発<br><input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法<br><input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法<br><input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法<br><input type="checkbox"/> その他 | 軽度    | J Clin Oncol 21: 1431-9, 2003 |

### 〈注意事項/備考〉

- ✓ PTX : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
  - ✓ PTX : ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
  - ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあります
  - ✓ 点滴終了24時間経過後に、ジーラスタを投与（day2-3が目安）
  - ✓

✓

---

:>



4



\_