

## 癌化学療法輸液約束処方 呼84

癌種 EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌  
レジメン名 呼84 PEM+AMI

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1サイクル期間
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	500 mg/m <sup>2</sup>	div	10分	DAY 1	21日間
ライブリバント	アミバンタマブ	AMI	下記参照	div	120分		

### [ DAY 1 ]

- ① NS 100ml + デキサート 1V + グラニセトロン 1A / 30分
- ② NS 100ml + アリムタ mg / 10分
- ③ NS 100ml / 30分
- ④ アセリオ 75ml / 15分
- ⑤ NS 100ml + ポララミン 1A / 15分
- ⑥ NS 50ml / 5分
- ⑦ 5%Tz 250ml + ライブリバント mg / 120分☆フィルター使用
- ⑧ NS 100ml / 10分

ライブリバントの投与量	
体重80kg未満	体重80kg以上
1,750 mg	2,100 mg

副作用発現時にライブリバントを減量する場合の投与量			
副作用発現時の投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量
1,750 mg	1,400 mg	1,050 mg	中止
2,100 mg	1,750 mg	1,400 mg	

### 【注意事項】

- ・呼83の維持療法
- ・休薬基準:Gr3以上の非血液毒性 減量基準:骨髄抑制
- ・アリムタ投与時のパンビタン末、ビタミンB12の予防投与の詳細については呼15参照
- ・ライブリバントは5%Tzに希釈し全量を250mLに調整する。

R7.7.29改訂  
R7.6.7改訂  
R7.3.7改訂  
R7.1.27作成