

癌化学療法輸液約束処方 呼86

癌種 EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
レジメン名 呼86 AMI+Laze

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1サイクル期間
ライブリバント	アミバンタマブ	AMI	下記参照	div	下記参照	DAY 1	28日間
ラズクルーズ	ラゼルチニブ	Laze	240mg	po	1日1回	連日	

[1サイクル目DAY 1,2]

- ① NS 100ml + デキサート 3V / 15分
- ② アセリオ 75ml / 15分
- ③ NS 100ml + ポララミン 1A / 15分
- ④ NS 50ml / 5分
- ⑤ 5%Tz 250ml + ライブリバント mg / 下記参照☆filtrate使用
- ⑥ NS 100ml / 10分

[1サイクル目DAY 8以降]

- ① アセリオ 75ml / 15分
- ② NS 100ml + ポララミン 1A / 15分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ 5%Tz 250ml + ライブリバント mg / 下記参照☆filtrate使用
- ⑤ NS 100ml / 10分

【注意事項】

- ・休薬基準:Gr3以上のインフュージョンリアクション、Gr4の皮膚障害など 減量基準:Gr3の皮膚障害
- ・ラゼルチニブ減量規定 240→160→80mg→中止
- ・開始後4カ月はアピキサバン(エリキュース[®])1回2.5mgを1日2回内服する(静脈血栓塞栓症の予防)
- ・ライブリバントは5%Tzに希釈し全量を250mLに調整する。

ライブリバントの投与量および投与速度

サイクル	投与日	投与量		投与速度					
		体重80kg未満	体重80kg以上	投与開始時	体重80kg未満	体重80kg以上	投与開始2時間後		
1サイクル目	DAY 1	350 mg		50 ml/hr		75 ml/hr			
	DAY 2	700 mg	1,050 mg	50 ml/hr	35 ml/hr	75 ml/hr	50 ml/hr		
	DAY 8	1,050 mg	1,400 mg	投与開始時		体重80kg未満			
				85 ml/hr(3時間で投与)		65 ml/hr(4時間で投与)			
	DAY 15	1,050 mg	1,400 mg	125 ml/hr(2時間で投与)		85 ml/hr(3時間で投与)			
	DAY 22	1,050 mg	1,400 mg	125 ml/hr(2時間で投与)					
2サイクル目以降	DAY 1	1,050 mg	1,400 mg	125 ml/hr(2時間で投与)					
	DAY 15	1,050 mg	1,400 mg	125 ml/hr(2時間で投与)					

副作用発現時にライブリバントを減量する場合の投与量

副作用発現時の投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量
1,050 mg	700 mg	350 mg	中止
1,400 mg	1,050 mg	700 mg	

R7.7.29作成