

癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 再発・難治性の濾胞性リンパ腫

レジメン名 NHL20 モスネツズマブ

薬品名(商品名)	一般名	標準投与量	投与経路	投与日	1コース期間
ルンスミオ	モスネツズマブ	1コース目Day1:1mg	div	1コース目:Day1,8,15	21日間
		1コース目Day8:2mg			
		1コース目Day15:60mg			
		2コース目:60mg			
		3コース目:30mg			

1コース目【DAY 1,8】

① NS 50ml + デキサート 2.5V / 60分

② NS 50ml / 5分

③ NS 100ml + ルンスミオ mg / 4hr
★フィルター不可

④ NS 50ml / 90分

1コース目【DAY 15】

① NS 50ml + デキサート 2.5V / 60分

② NS 50ml / 5分

③ NS 250ml + ルンスミオ 60 mg / 4hr
★フィルター不可

④ NS 50ml / 90分

<備考>

① 8コース終了後:CR→投与終了、SDまたはPR→17コース目まで継続

② 投与30分前までにアセトアミノフェン600mg、レスタミン50mg内服(1コース目DAY1は必須)

③ CRS、ICANSのモニタリングのため、1コース目は入院管理

④ CRSの際は院内のCRS対策フローチャート参照

⑤ 休薬期間により投与量をステップアップ用量へ戻す(別紙参照)

2コース目【DAY 1】

① NS 50ml + デキサート 2.5V / 60分

② NS 50ml / 5分

③ NS 250ml + ルンスミオ 60 mg / 2hr
★フィルター不可

④ NS 50ml / 90分

3コース目以降【DAY 1】

(オプション: NS 50ml + デキサート 2.5V / 60分)

① NS 50ml / 5分

② NS 100ml + ルンスミオ 30 mg / 2hr
★フィルター不可

③ NS 50ml / 90分

< 休薬基準 >

好中球<1500、Hb<8.0、PLT<50000、FN、CRS、ICANS、低γグロブリン血症、ILD

R7.7.29作成