

癌化学療法輸液約束処方 食19

癌種

レジメン名 食19 TISL

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
テムビブラ	チスレリズマブ	TISL	200 mg/body	div	1回目 60分 2回目以降 30分	DAY 1	21日

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 50ml + テムビブラ 200 mg / 30~60分 (インラインフィルター使用)
- ③ NS 50ml / 5分

<休薬規定>

- ・AST,ALT \geq Grade3 ・間質性肺炎: G1→投与延期を検討、G2→投与延期、G3→投与中止
- ・有害事象 \geq Grade2 ・重症筋無力症、筋炎、:投与中止
- ・自己免疫疾患の発症 ・大腸炎、下痢: G2→投与延期(G1→再開)、 \geq G3→投与中止
 ・肝機能障害: G2→投与延期(ベースラインまで改善→再開)、 \geq G3→投与中止
 ・内分泌障害、副腎クリーゼ: 投与延期または中止
 ・神経毒性: G2→投与延期(ベースラインに改善→再開)、 \geq G3→投与中止
 ・皮膚毒性: \geq G3→投与延期(G1→再開)
 ・腎毒性: G2→投与延期(G1→再開)、 \geq G3→投与中止
 ・1型糖尿病、脳炎、静脈血栓症: 専門医と連携し投与中止も検討

R7.10.6 作成