

# 癌化学療法輸液約束処方 乳27

癌種 乳癌

レジメン名 乳27 ATEZO + nabPTX(4週ごと)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
テセントリク	アテゾリズマブ	ATEZO	1680 mg/body	div	初回60分 以降30分	DAY 1	28日間
アブラキサン	アルブミン懸濁型パクリタキセル	nabPTX	100 mg/m <sup>2</sup>	div	30分	DAY 1,8,15	

## [ DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml + テセントリク 1680 mg / 初回60分 2回目以降30分  
☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分

Rp3終了後、側管から投与開始

- ④ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ⑤ NS 50ml + アブラキサン mg / 30分 ★フィルター不可
- ⑥ NS 50ml / 5分

## [ 備考 ]

テセントリクはフィルター使用 Rp4からはフィルターなしで側管より投与開始

アブラキサンは、最終濃度:5mg/mlに調製すること。フィルターなし、他剤との配合は不可。

アルブミン製剤のため、製造番号を確認すること。投与時、患者の同意書が必要。

## [ 休薬基準 ]

Day1:好中球数<1500 血小板数<10万 Day8,15:好中球数<500 血小板数<5万

AST・ALT>10×ULNまたはT-bli>1.5 Grade3以上の非血液毒性、全Grade肺事象

## [ 減量基準 ]

1.5×ULN<T-bli≤5×ULNかつAST<10×ULN Grade3の下痢、口内炎 Grade3以上の吐気嘔吐、その他非血液毒性

## [ DAY 8、15 ]

- ① NS 50ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ② NS 50ml + アブラキサン mg / 30分 ★フィルター不可
- ③ NS 50ml / 5分