

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： OVA-101

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 | 催吐 リスク | 根拠 |
|------|-----------|-------|-------|---|-----------|---|
| 卵巣がん | CBDCA+GEM | 21日間 | 6コース | <input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | 高/中 | Int J Gynecol Cancer 15: 36-41, 2005 J Clin Oncol 24: 4699-707, 2006 |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ① | デキサート パロノセトロン アロカリス | 6.6mg 0.75mg/50mL 235mg | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサート 生理食塩液 | 6.6mg 50mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| ② | ゲムシタビン 生理食塩液 | 1000mg/m ² 100mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | カルボプラチン 5%ブドウ糖液 | AUC 4 250mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

＜注意事項/備考＞

- ✓ プラチナ製剤感受性（TFI≥6か月）の再発卵巣がんを対象
- ✓ CBDCA：投与回数を重ねると、ショック、アナフィラキシー様症状の発現頻度が高くなる傾向（8コース前後）
- ✓ GEM：血管痛、皮疹に注意
- ✓ GEM：30分かけて投与（60分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）
- ✓