

# 癌化学療法輸液約束処方 骨軟1

癌種

骨軟部肉腫

レジメン名 骨軟1

ADM + CDDP

| 薬品名 (商品名) | 一般名     | 略号   | 標準投与量                 | 投与経路 | 投薬期間    | 休薬期間 | 1クール期間 |
|-----------|---------|------|-----------------------|------|---------|------|--------|
| ドキソルビシン   | ドキソルビシン | DXR  | 30 mg/m <sup>2</sup>  | div  | DAY 1-2 | -    | 4週     |
| シスプラチン    | シスプラチン  | CDDP | 100 mg/m <sup>2</sup> | div  | DAY 1   | -    | 4週     |

## < 化学療法前日 >

div

- ① ラクテック 500 ml / 朝
- ② ソルデム3A 500 ml / 朝
- ③ ソルデム3A 500 ml / 夕
- ④ ソルデム3A 500 ml / 夕

## < DAY 1 >

div

- 0:00 ① ソルデム3A 500 ml / 4hr
- 4:00 ② ソルデム3A 500 ml / 2hr
- 6:00 ③ ソルデム3A 500 ml / 1.5hr
- 7:30 ④ ソルデム3A 500 ml / 1.5hr
- 9:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml  
+ メトクロプラミド 2A  
+ ポララミン 1A  
+ ソル・メルコート 125 mg / 1.5hr
- 10:30 ⑥ セロトーン 1A (iv)
- 10:30 ⑦ 生食 250 ml + シスプラチン mg / 5hr
- 10:30 ⑧ 側管) マンニトール 300 ml / 5hr
- 15:30 ⑨ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 10 mg / 1.5hr
- 17:00 ⑩ 生食 50 ml + ドキソルビシン mg / 30min
- 17:30 ⑪ ソルデム3A 500 ml + コントミン 10 mg / 1.5hr
- 19:00 ⑫ ソルデム3A 500 ml + アタラックスP 50 mg / 1.5hr
- 20:30 ⑬ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 10 mg / 1.5hr
- 22:00 ⑭ ラクテック 500 ml + コントミン 10 mg / 2hr

## < DAY 2 >

div

- 0:00 ① ソルデム3A 500 ml / 3hr
- 3:00 ② ソルデム3A 500 ml / 3hr
- 6:00 ③ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 10 mg / 3hr
- 9:00 ④ ソルデム3A 500 ml + メトクロプラミド 2A / 3hr
- 12:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml + ソル・メルコート 40 mg / 2.5hr
- 14:30 ⑥ 生食 50 ml + ドキソルビシン mg / 30min
- 15:00 ⑦ ソルデム3A 500 ml + アタラックスP 50 mg / 3hr
- 18:00 ⑧ ソルデム3A 500 ml / 3hr
- 21:00 ⑨ ラクテック 500 ml / 3hr

## < DAY 3 >

div

- 0:00 ① ソルデム3A 500 ml / 4hr
- 4:00 ② ソルデム3A 500 ml / 4hr
- 8:00 ③ ソルデム3A 500 ml / 4hr
- 12:00 ④ ソルデム3A 500 ml / 4hr
- 16:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml / 4hr
- 20:00 ⑥ ソルデム3A 500 ml / 4hr

## < DAY 4 >

div

- 0:00 ① ソルデム3A 500 ml / 5hr
- 5:00 ② ソルデム3A 500 ml / 5hr
- 10:00 ③ ソルデム3A 500 ml / 5hr
- 15:00 ④ ソルデム3A 500 ml / 5hr
- 20:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml / 4hr

## < DAY 5-6 >

div

- ① ソルデム3A 500 ml / 朝
- ② ソルデム3A 500 ml / 朝
- ③ ソルデム3A 500 ml / 夕

R8.6.22 改訂

H27.10.1 改訂