

癌化学療法約束処方 子体3

癌種 子宮体癌
登録No. 子体3 CAP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	50～75 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
エピルビシン	エピルビシン	EPI	50 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
テラルビシン	ピラルビシン	THP	30 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週

< CAP前日 >

21:00-24:00 ① ラクテック 500 ml

< CAP療法当日 >

0:00-5:00 ① ビカネイト 1000 ml
 5:00-7:00 ② ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g
 7:00-8:30 ③ マンニトール 300 ml
 8:30-10:00 ④ ソリューゲンF 500 ml + ソル・メルコート 125mg
 10:00-10:30 ⑤ NS 50 ml + アロキシ 1A イメンドカプセル125mg服用
 10:30-12:30 ⑥ NS 250 ml + シスプラチン mg
 12:30 側 NS 50 ml + エピルビシン or ピラルビン mg ☆エピルビシンは原液投与
 12:30 側 NS 50 ml + エンドキサン mg
 12:30-14:30 ⑦ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + プリンペラン 1,
 14:30-17:00 ⑧ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg
 17:00-19:30 ⑨ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g
 19:30-22:00 ⑩ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A
 ⑪ ヘパリンNaロック用 1本

< CAP療法 2-4日目 >

① ソルラクト 500 ml / 2.5hr
 ② NS 50 ml + デキサート1V / 5分
 ③ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g / 2.5hr
 ④ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg / 2.5hr
 ⑤ ソルデム3A 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A / 2.5hr
 ⑥ ヴィーンD 500 ml + ホスホマイシン 2g / 2.5hr
 ⑦ ヘパリンNaロック用 1本

2日目 ①～⑦投与 ②開始時 イメンドカプセル80mg 服用

3日目 ③～⑦投与 ③開始時 イメンドカプセル80mg 服用

4日目 ③, ⑤, ⑥, ⑦投与後終了抜針で

R8.6.22 改訂

H26.10.31 改訂