

癌化学療法約束処方 子体4

癌種

子宮体癌

周術期投与期間要注意

登録No. 子体4

AP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	50 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
エピルビシン	エピルビシン	EPI	50 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
テラルビシン	ピラルビシン	THP	30 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	DXR	60 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週

< AP前日 >

21:00-24:00 ① ソルラクト 500 ml

< AP療法当日 >

0:00-5:00 ① ビカネイト 1000 ml

5:00-7:00 ② ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g

7:00-8:30 ③ マンニトール 300 ml

8:30-10:00 ④ ソリューゲンF 500 ml + ソル・メルコート 125mg

10:00-10:30 ⑤ NS 100 ml + アロキシ 1A+ アロカリス 1A

10:30-12:30 ⑥ NS 250 ml + シスプラチン mg

12:30 側 NS 50 ml + ドキシソルビシン mg

☆注意

12:30-14:30 ⑦ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A

14:30-17:00 ⑧ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg

17:00-19:30 ⑨ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g

19:30-22:00 ⑩ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A

⑪ ヘパリンNaロック用 1本

☆注意:エピルビシンは原液投与

< AP療法 2-4日目 >

① ソルラクト 500 ml / 2.5hr

② 生食 100 ml + デキサート1V + メトクロプラミド 1A / 30分

③ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g / 2.5hr

④ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg / 2.5hr

⑤ ソルデム3A 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A / 2.5hr

⑥ ヴィーンD 500 ml + ホスホマイシン 2g / 2.5hr

⑦ ヘパリンNaロック用 1本

2日目 ①～⑥, ⑦投与

3日目 ②～⑥, ⑦投与

4日目 ③, ⑤, ⑥投与後終了抜針で

R8.6.22 改訂