

がん化学療法輸液約束処方 子頸2

癌種

子宮頸癌(腺癌)

登録No. 子頸2

MEP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	点滴時間	投与経路	投薬期間	1クール期間
マイトマイシンC	マイトマイシン	MMC	10 mg/m2	30分	点滴注射	DAY 1	28日間
ベプシド	エトポシド	ETO	100 mg/m2	120分		DAY 1, 3, 5	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	50 mg/m2	120分		DAY 1	

【 DAY 0 】	21:00～6:00	①	テルモ生食 1000ml / 9時間
【 DAY 1 】	6:00～9:00	①	NS 500ml + ファモチジン 1V + ホスホマイシンNa 2g / 3時間
	9:00～10:00	②	NS 250ml + デキサート2V / 1時間
	10:00～10:30	③	NS 100ml + ラモセトロン 1A / 30分
	10:30～12:30	④	NS 250ml + シスプラチン <u>mg</u> / 2時間
	12:30～13:30	⑤	NS 250ml + 8.4%メイロン 20ml + メトクロプラミド 1A / 1時間
	13:30～15:30	⑥	NS 500ml + エトポシド <u>mg</u> / 2時間 <u>*PVCフリーライン フィルターなし</u>
	15:30～16:00	⑦	NS 50ml + マイトマイシンC <u>mg</u> / 30分
	16:00～18:30	⑧	NS 500ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシンNa 2g / 2.5時間
	18:30～19:00	⑨	NS 50ml + ラモセトロン1A / 30分
	19:00～22:00	⑩	NS 500ml + 8.4%メイロン 20ml + メトクロプラミド 1A / 3時間
	22:00～2:00	⑪	ビカナイト 1000ml / 4時間
【 DAY 2 】	2:00～7:00	①	NS 500ml / 5時間
	7:00～12:00	②	ソリューゲンF 500ml + デキサート1V / 5時間
	9:00～9:30	③	側)NS 50ml + ラモセトロン1A / 30分
	12:00～17:00	④	ソルデム3A 500ml + ファモチジン 1A + ネオファーゲン 1A + タチオン 1A / 5時間
	17:00～22:00	⑤	ソリューゲンF 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 5時間
【 DAY 3 】	6:00～9:00	①	ソリューゲンF 500ml + デキサート1V / 3時間
	9:00～10:30	②	NS 250ml + 8.4%メイロン 20ml / 1.5時間
	10:30～11:00	③	NS 100ml + ラモセトロン1A / 30分
	11:00～13:00	④	NS 500ml + ベプシド <u>mg</u> / 2時間 <u>*PVCフリーライン フィルターなし</u>
	13:00～16:00	⑤	ソルデム3A 500ml + ネオファーゲン 1A + ファモチジン 1V / 3時間
	16:00～16:30	⑥	NS 100ml + ラモセトロン1A / 30分
	16:30～19:00	⑦	ソリューゲンF 500ml / 2.5時間
	19:00～22:00	⑧	ソルデム3A 500ml / 3時間
【 DAY 4 】	9:00～12:00	①	ソリューゲンF 500ml + タチオン 1A + ネオファーゲン 1A / 3時間
	12:00～15:00	②	ソルデム3A 500ml + ファモチジン 1A + デキサート0.5 V / 3時間
	15:00～18:00	③	ソリューゲン500ml / 3時間
	18:00～21:00	④	ソルデム3A 500ml / 3時間
【 DAY 5 】	DAY 3と同じ		
【 DAY 6 】	DAY 4と同じ		

R8.6.
H26.10

R8.6.22 改訂

H26.10.31 改訂