

癌化学療法約束処方 子頸8

癌種 子宮頸癌
登録No. 子頸8 CCRT+Pembro200mg

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	40 mg/m ²	div	DAY 1.8.15.22.29.(36)	－	5-6週
キイトルーダ	ペンブロリズマブ	PEMBRO	200mg/body	div	DAY 1.22	3週	

[DAY 1, 22]

- ① NS 50 ml / 5分
- ② NS 100 ml + キイトルーダ 200 mg / 30分
- ③ NS 50 ml / 5分
- ④ ヴィーンD 500 ml / 2時間
- ⑤ ソルデム3A 500 ml + デキサート1V / 2時間
- ⑥ NS 100 ml + パロノセトロン1A + アロカリス1A / 30分
- ⑦ NS 250 ml + シスプラチン mg / 2時間
- ⑧ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 1A / 3時間
- ⑨ ヴィーンD 500 ml + デキサート1V / 3時間
- ⑩ ソルデム3A 500 ml + メトクロプラミド 1A / 3時間

[DAY 8, 15, 29, 36]

- ① ヴィーンD 500 ml / 2時間
- ② ソルデム3A 500 ml + デキサート1V / 2時間
- ③ NS 100 ml + パロノセトロン1A + アロカリス1A / 30分
- ④ NS 250 ml + シスプラチン mg / 2時間
- ⑤ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 1A / 3時間
- ⑥ ヴィーンD 500 ml + デキサート1V / 3時間
- ⑦ ソルデム3A 500 ml + メトクロプラミド 1A / 3時間

【注意事項】 本レジメン終了後はPembro維持療法移行:Pembro400mg 6週毎 15クールまたは200mg 3週毎30クール(24ヵ月まで)
 【休薬基準】 CDDP;血液毒性≥Grade3 非血液毒性≥Grade3 Pembro;共通PEMBROレジメン参照
 【減量基準】 CDDP;血液毒性≥Grade2 非血液毒性≥Grade2 Pembro;共通PEMBROレジメン参照

R8.6.22 改訂
R7.1.31 作成