

癌化学療法輸液約束処方 食3

癌種 食道癌

レジメン名 食3 FP (5FU + CDDP)

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	800 mg/m ²	civ	DAY 1-5	-	3週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m ²	div	DAY 1	-	3週

【DAY 1】〈CV〉

① NS 50ml / 5分点滴静注 ラインキープ用

10:00-10:00 ② NS 1000 ml + フルオロウラシル(5FU) mg + メトクロプラミド 2A / 24時間持続点滴静注

〈側管〉

10:00-12:00 ③ ヴィーンD 500 ml + マグネゾール 1A / 120分点滴静注

12:00-12:15 ④ NS 100 ml + グラニセトロン 1A / 15分点滴静注 ☆イメンド125mg内服

12:15-12:30 ⑤ NS 100 ml + デキサート 1V / 15分点滴静注

12:30-14:30 ⑥ NS 250 ml + シスプラチン mg / 120分点滴静注

14:30 ⑦ フロセミド 1A / 静注

14:30-16:30 ⑧ ビーフリード 500 ml / 120分点滴静注

16:30-18:30 ⑨ ヴィーンF 500 ml + メトクロプラミド 1A / 120分点滴静注

【DAY 2-5】〈CV〉

10:00-10:00 ① フルカリック1号 903 ml + フルオロウラシル(5FU) mg + メトクロプラミド 2A / 24時間持続点滴静注

〈側管〉

12:00-12:15 ② NS 100 ml + グラニセトロン 1A / 15分点滴静注

12:15-12:30 ③ NS 100 ml + デキサート1V / 15分点滴静注

<DAY5のみ> ④ NS 50 ml / 5分点滴静注 メイン終了後 フラッシュ用>

【備考】 イメンド125mg、DAY2～⇒80mg

R8.6.22 改訂

H27.6.3改訂