

癌化学療法輸液約束処方 食13

癌種 食道癌

レジメン名 食13 FP(末梢)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	800 mg/m ²	div	24時間	DAY 1-5	21日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m ²	div	120分	DAY 1	

【 DAY 1 】

- ① NS 1000 ml + マグネゾール1A + KCl 1キット / 120分
- ② NS 100 ml + デキサート 1.5V / 10分
- ③ NS 100 ml + アロカリス 1V + アロキシ 1V / 30分
- ④ NS 250 ml + シスプラチン mg / 120分
- ⑤ NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間

側管 div ⑤と同時

- ① NS 500ml / 60分
- ② マンニトール300 ml / 60分

【 備考 】

- ・シスプラチンの神経障害(聴覚障害など)に注意 総投与量:500-600mg/m²
- ・静脈炎に注意
- ・必要に応じて補液追加

【 投与基準 】

Cre $\leq$ 1.2 BUN $\leq$ 25mg/dl Ccr $\geq$ 60ml/min T-bili $\leq$ 1.2mg/dl AST,ALT $\leq$ ULN $\times$ 2
WBC $\geq$ 4000 好中球 $\geq$ 1500 Hb $\geq$ 10 Plt $\geq$ 10 $\times$ 10⁹/m³

【 DAY 2,3,4,5 】

- ① NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間
- ② NS 50 ml / 5分 (Day 5のみ)

側管

10:00～ NS 100 ml + デキサート1V / 30分