

癌化学療法輸液約束処方 食18

癌種 食道癌

レジメン名 食18 TISL+FP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間
テビムブラ	チスレリズマブ	TISL	200 mg/ body	div	1回目60分 2回目以降30分	DAY 1	21日間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	800 mg/m ²	div	24時間	DAY 1-5	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m ²	div	120分	DAY 1	

【 DAY 1 】

- ① NS 100ml / 10分
- ② NS 50ml + テムビブラ 200 mg / 30～60分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 1000 ml + マグネゾール1A + KCl 1キット / 120分
- ⑤ NS 100 ml + デキサート 1.5V / 10分
- ⑥ NS 100 ml + アロカリス 1V + パロノセトロン 1V / 30分
- ⑦ NS 250 ml + シスプラチン mg / 120分
- ⑧ NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間

側管 div ⑧と同時

- ① NS 500ml / 60分
- ② マンニトール300 ml / 60分

【 備考 】

- ・静脈炎に注意
- ・必要に応じて補液追加

【 投与基準 】

Cre $\leq$ 1.2 BUN $\leq$ 25mg/dl Ccr $\geq$ 60ml/min T-bli $\leq$ 1.2mg/dl AST,ALT $\leq$ ULN $\times$ 2
WBC $\geq$ 4000 好中球 $\geq$ 1500 Hb $\geq$ 10 Plt $\geq$ 10 $\times$ 10³/m³

【 DAY 2,3,4,5 】

- ① NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間
- ② NS 50 ml / 5分(Day 5のみ)

側管

10:00～ NS 100 ml + デキサート1V / 30分

【 TISL休業基準 】

食19参照

R8.6.22 改訂

R7.10.6 作成