

## がん化学療法輸液約束処方 頭頸2

がん種:頭頸部癌

レジメン名:頭頸2 CDDP + 5FU

| 薬品名(商品名) | 一般名      | 略号   | 標準投与量                 | 投与経路 | 投薬期間              | 休薬期間 | 1コースの期間 |
|----------|----------|------|-----------------------|------|-------------------|------|---------|
| フルオロウラシル | フルオロウラシル | 5FU  | 700 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | DAY 1, 2, 3, 4, 5 | 23日間 | 28日間    |
| シスプラチン   | シスプラチン   | CDDP | 70 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | DAY 1             | 27日間 |         |

### DAY 0【メイン】

9:00 ① ビカネイト 1000ml  
+ アスパラカリウム2キット / 12hr  
21:00 ② = ① do

### DAY 1【メイン】

9:00 ① ビカネイト 1000ml  
+ フルオロウラシル mg  
+ ファモチジン 1V  
+ メトクロプラミド 1A  
+ アスパラカリウム2キット / 12hr  
21:00 ② = ① do

#### 【側管】

9:00 ① 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min  
10:00 ② NS 100ml  
+ デキサート2V + セロトーン 1A / 30min  
10:30 ③ NS 250ml + シスプラチン mg / 120min  
12:30 ④ 20%マンニトール 300ml / 60min  
13:30 ⑤ ソルデム3A 500ml / 180min  
16:30 ⑥ NS 100ml + セロトーン 1A / 30min  
17:00 ⑦ ソルデム3A 500ml / 240min  
21:00 ⑧ 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min

\* 備考 ① 対象患者の全身状態によりシスプラチンの投与時間および投与後の水分負荷量(投与時間含む)は変更可とする

### DAY 2.3【メイン】

9:00 ① ビカネイト 1000ml  
+ フルオロウラシル mg  
+ ファモチジン 1V  
+ メトクロプラミド 1A  
+ アスパラカリウム2キット / 12hr  
21:00 ② = ① do

#### 【側管】

9:00 ① 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1A / 60min  
10:00 ② NS 100ml  
+ デキサート 1V + セロトーン 1A / 30min  
10:30 ③ ソルデム3A 500ml / 180min  
13:30 ④ ソルデム3A 500ml / 180min  
21:00 ⑤ 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min

### DAY 4.5【メイン】

9:00 ① ビカネイト 1000ml  
+ フルオロウラシル mg  
+ ファモチジン 1V  
+ メトクロプラミド 1A  
+ アスパラカリウム2キット / 12hr  
21:00 ② = ① do

#### 【側管】

9:00 ① 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min  
10:00 ② NS 100ml  
+ デキサート 1V + セロトーン 1A / 30min  
21:00 ③ 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min