

癌化学療法輸液約束処方 尿1

癌種

膀胱癌

レジメン名 尿1

GEM + CDDP(変法)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	600～1000 mg/m ²	div	DAY 1, 8, 15	1週	4週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	70 mg/m ²	div	DAY 1	3週	4週

DAY 1

- ① アクチット 500 ml / 1.5時間
- ② フィジオ140 500 ml / 1.5時間
- ③ NS 50 ml + ファモチジン 1A + デキサート 2V / 5分
- ④ NS 100 ml + アロキシ 1A + アロカリス 1V / 30分
- ⑤ NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分 時間厳守
- ⑥ NS 250 ml + シスプラチン mg / 2時間
- ⑦ アクチット 500 ml + フロセミド 20mg + メトクロプラミド 2A / 1.5時間 (別々のシリンジで)
- ⑧ フィジオ140 500 ml + メトクロプラミド 2A / 1.5時間
- ⑨ フィジオ140 500 ml + メトクロプラミド 1A / 1.5時間

DAY 8, 15

- ① NS 50 ml + デキサート 1V / 5分
- ② NS 100 ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ③ NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分 時間厳守
- ④ NS 50 ml / 5分

【備考】

R8.6.22 改訂
2022.12.2改訂