

癌化学療法輸液約束処方 脳 7

癌種 germinoma、medulloblastomaなどの悪性脳腫瘍

レジメン名 脳 7 ICE療法

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	1クール期間
エトポシド	エトポシド	VP-16	60 mg/m ²	div	2時間	DAY1-5	4週
ウロミテキサン	メスナ		270 mg/m ² ×3	div	30分		
イホマイド	イホスファミド	IFM	900 mg/m ²	div	2時間		
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	20 mg/m ²	div	2時間		

[DAY 1-5]

6:00-9:30	① ヴィーンD 500ml / 3.5時間	【備考】
9:30-10:00	② NS 100ml + グラニセトロン 3mg + デキサート 4mg / 30分	① 通常6コース 最大8コース(聴力モニタリング)
10:00-12:00	③ 5%TZ 500ml + <u>エトポシド</u> <u> </u> mg / 2時間 ☆フィルターなし ② 減量・中止基準:別紙参照	
12:00-14:00	④ NS 500ml + <u>イホマイド</u> <u> </u> mg / 2時間 ファシール使用	③ Rp⑪のウロミテキサンの投与タイミングは Rp⑤を同時投与 Rp⑧の開始時間からの起算を優先
12:00-12:30	【側管】⑤ NS 100ml + <u>ウロミテキサン</u> <u> </u> mg / 30分 側管よりRp④と同時投与	
14:00-14:30	⑥ NS 100ml + グラニセトロン 3mg + デキサート 4mg / 30分	
14:30-16:30	⑦ NS 250ml + <u>シスプラチン</u> <u> </u> mg / 2時間	
16:30-17:00	⑧ NS 100ml + <u>ウロミテキサン</u> <u> </u> mg / 30分	
17:00-18:30	⑨ 20%マンニトール 300ml / 1.5時間	
18:30-翌日6:00	⑩ ソルデム3A 500ml + ヴィーンD 500ml / 11.5時間	
20:30-21:00	【側管】⑪ NS 100ml + <u>ウロミテキサン</u> <u> </u> mg / 30分 Rp⑩の側管より投与(Rp⑧開始から4時間後に投与)	

R8.6.22 改訂

R2.8.6作成