

癌化学療法約束処方 卵巣8

癌種 卵巣癌
登録No. 卵8 CAP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	50～75 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
エピルビシン	エピルビシン	EPI	50 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
テラルビシン	ピラルビシン	THP	30 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500 mg/m ²	div	DAY 1	2～3週	3～4週

< CAP前日 >

21:00-24:00 ① ラクテック 500 ml

【内服薬】 CAP当日: イメンドカプセル125mg内服
DAY2,3: イメンドカプセル80mg内服

< CAP療法当日 >

- 0:00-5:00 ① ビカネイト 1000 ml
- 5:00-7:00 ② ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g
- 7:00-8:30 ③ マンニトール 300 ml
- 8:30-10:30 ④ ソリューゲンF 500 ml + ソル・メルコート 125mg
- 10:00-10:30 ⑤ NS 100 ml + アロキシ0.75mg・イメンドセット併用
- 10:30-12:30 ⑥ NS 250 ml + シスプラチン mg
- 12:30 側 NS 50 ml + エピルビシン or テラルビシン mg
- 12:30 側 NS 50 ml + エンドキサン mg
- 12:30-14:30 ⑦ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + プリンペラン 1A
- 14:30-17:00 ⑧ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg
- 17:00-19:30 ⑨ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g
- 19:30-22:00 ⑩ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A
- ⑪ ヘパリンNaロック用 1本

< CAP療法 2-4日目 >

- ① ラクテック 500 ml / 2.5hr
- ② ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g / 2.5hr
- ③ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg / 2.5hr
- ④ ソルデム3A 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A / 2.5hr
- ⑤ ヴィーンD 500 ml + ホスホマイシン 2g / 2.5hr
- ⑥ ヘパリンNaロック用 1本

2日目 ①～⑥投与

3日目 ②～⑥投与

4日目 ②, ④, ⑤, ⑥投与後終了抜針で

H26.10.31改訂

R8.6.22 改訂