

## 癌化学療法輸液約束処方 呼 45

癌種 非小細胞肺癌 ( StageⅢB/Ⅳ)(非扁平上皮癌) (入院)  
 レジメン名 呼45 CDDP + PEM + PEMBRO

| 薬品名 (商品名) | 一般名      | 略号     | 標準投与量                 | 投与経路 | 投与日   | 1クール期間 |
|-----------|----------|--------|-----------------------|------|-------|--------|
| アリムタ      | ベメトレキセド  | PEM    | 500 mg/m <sup>2</sup> | div  | DAY 1 | 21日間   |
| シスプラチン    | シスプラチン   | CDDP   | 75 mg/m <sup>2</sup>  | div  | DAY 1 |        |
| キイトルーダ    | ペムブロリズマブ | PEMBRO | 200 mg/body           | div  | DAY 1 |        |

### 【 DAY 1 】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分  
 ☆インラインフィルター使用
- ③ NS 500ml / 90分
- ④ NS 500ml + マグネゾール20ml / 90分
- ⑤ NS 50ml + デキサート 2V / 5分
- ⑥ NS 50ml + アロキシ1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑦ NS 100ml + アリムタ mg / 10分
- ⑧ NS 100ml / 15分
- ⑨ NS 250ml + シスプラチン mg / 90分
- ⑩ マンニトール300ml / 60分
- ⑪ NS 500ml / 90分
- ⑫ ソルデム3A 500ml / 90分

### 【 DAY 2,3 】

- ① NS 500ml + メトクロプラミド2A / 90分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 5分
- ③ ソルデム3A 500ml + メトクロプラミド 2A / 90分

### 【備考】

- ① 輸液の量 (hydration)は、主治医判断で減量可。
- ② アリムタ投与7日以上前から、パンビタン末1.0gを連日経口投与。投与終了後2日まで。(添付文書)
- ③ アリムタ投与7日以上前にビタミンB12 1.0mgを筋肉内注射し、アリムタ治療中はお週毎にくり返す。(添付文書)
- ④ パンビタン(葉酸)及びVB12の投与はアリムタ投与日まで(投与当日開始も可)に開始すれば可とする。
- ⑤ 4コースまで
- ⑥ 休薬:Gr3以上の非血液毒性 減量:Gr4の好中球減少5日以上 Gr4の血小板減少
- ⑦ PEMBROの投与基準などは呼38参照

R8.6.22 改訂  
 R4.12.2改訂