

癌化学療法輸液約束処方 呼 53

癌種 非小細胞肺癌(StageⅢB/Ⅳ)(非扁平上皮癌) (入院)
レジメン名 呼53 CDDP + PEM + ATEZO

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
アリムタ	ベメトレキセド	PEM	500 mg/m ²	div	DAY 1	21日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75 mg/m ²	div	DAY 1	
テセントリク	アテゾリズマブ	ATEZO	1200 mg/body	div	DAY 1	

【 DAY 1 】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml + テセントリク 1200 mg / 1コース目60分 2コース目以降30分
☆インラインフィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 500ml + マグネゾール20ml / 90分
- ⑤ NS 100ml + デキサート 1V / 10分
- ⑥ NS 100ml + アロキシ1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑦ NS 100ml + アリムタ _____ mg / 10分
- ⑧ NS 100ml / 10分
- ⑨ NS 250ml + シスプラチン _____ mg / 90分
- ⑩ マンニトール300ml / 60分
- ⑪ NS 500ml / 90分
- ⑫ ソルデム3A 500ml / 90分

【備考】

- ① 輸液の量(hydration)は、主治医判断で減量可。
- ② アリムタ投与7日以上前から、パンビタン末1.0gを連日経口投与。投与終了後2日まで。(添付文書)
- ③ アリムタ投与7日以上前にビタミンB12 1.0mgを筋肉内注射し、アリムタ治療中はお週毎にくり返す。(添付文書)
- ④ パンビタン(葉酸)及びVB12の投与はアリムタ投与日まで(投与当日開始も可)に開始すれば可とする。
- ⑤ 6コースまで
- ⑥ 休薬:Gr3以上の非血液毒性 減量:Gr4の好中球減少5日以上 Gr4の血小板減少
- ⑦ ATEZOの投与基準などは呼40参照

R8.6.22 改訂

R4.12.2改訂