

癌化学療法輸液約束処方 呼66

癌種 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）
レジメン名 呼66 NIVO+IPI+CDDP+PEM

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	クール期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	360 mg/body	div	30分	DAY 1,22	42日間
ヤーボイ	イピリムマブ	IPI	1 mg/kg	div	30分	DAY 1	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75 mg/m ²	div	90分	DAY 1,22	
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	500 mg/m ²	div	10分	DAY 1,22	

【 DAY 1 】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + ヤーボイ mg / 30分 最終液量30mLに調製 ☆フィルター使用
- ⑤ NS 500ml / 90分
- ⑥ NS 500ml + マグネゾール1A / 90分
- ⑦ NS 100ml + デキサート 1V / 30分
- ⑧ NS 100ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑨ NS 100ml + アリムタ mg / 10分
- ⑩ NS 100ml / 30分
- ⑪ NS 250ml + シスプラチン mg / 90分
- ⑫ マンニトール 300ml / 90分
- ⑬ NS 500ml / 90分
- ⑭ NS 500ml / 90分

【注意事項】

- ・CDDP+PEMはday1,22の2回まで
- ・CDDP+PEMの投与基準は呼25参照
- ・NIVO+IPIの投与基準は腎3参照
- ・休薬: Gr3以上の非血液毒性 Gr4の血液毒性 減量: Gr3以上の非血液毒性 Gr4の血液毒性

【 DAY 22 】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 500ml / 90分
- ④ NS 500ml + マグネゾール1A / 90分
- ⑤ NS 100ml + デキサート 1V / 30分
- ⑥ NS 100ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑦ NS 100ml + アリムタ mg / 10分
- ⑧ NS 100ml / 30分
- ⑨ NS 250ml + シスプラチン mg / 90分
- ⑩ マンニトール 300ml / 90分
- ⑪ NS 500ml / 90分
- ⑫ NS 500ml / 90分

R8.6.22 改訂
R4.12.2 改訂