

癌化学療法輸液約束処方 胃1

癌種 胃癌 入院用(短期)切除不能・進行再発胃癌

レジメン名 胃16 XEL+CDDP 高用量

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
カペシタビン	カペシタビン	CAP	2000mg/m ²	po	2週(DAY1-14)	1週	21日
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	div	DAY1	2週	21日

div 化学療法前日

<メイン>

18:00-22:00 ①ソルデム3A 500ml / 240
22:00-翌日2:00 ②ソルデム3A 500ml / 240
翌日2:00-翌日7:00 ③ソルデム3A 500ml / 300

div 化学療法当日

<メイン>

7:00-8:30 ①5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
8:30-10:00 ②5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
10:00-11:30 ③5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
11:30-13:30 ④NS 250ml + シスプラチン mg / 120min
13:30-15:00 ⑤5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
15:00-16:30 ⑥5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
16:30-18:00 ⑦5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
18:00-22:00 ⑨ソルデム3A 500ml / 240min
22:00-翌日2:00 ⑩ソルデム3A 500ml / 240min

<側管>

10:30-11:00 1)NS 100ml + デカドロン1.5V / 30min
11:00-11:30 2)NS 50ml + アロキシ1V + アロカリス1V / 30min
13:30 3)NS 50ml + フロセミド 1A / 5min

div 化学療法翌日

<メイン>

2:00-6:00 ①ソルデム3A 500ml / 240min
6:00-10:00 ②ソルデム3A 500ml / 240min

<内服薬>

D2から内服 ②デカドロン錠4mg 2錠×3日間

【備考】

- 化学療法当日、尿量に応じて利尿剤を追加する
- 翌日退院を想定しているが、患者の状態によっては輸液の追加、退院の延期も可

R8.6.22 改訂

R4.12.2改訂