

癌化学療法輸液約束処方 胃17

癌種 胃癌 入院用(短期)切除不能・進行再発胃癌

レジメン名 胃17 HER+XEL+CDDP 高用量

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	1クール期間
トラスツズマブ	トラスツズマブ	HER	初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg	div	初回90分、2回目以降30分	DAY 1	21日
カペシタビン	カペシタビン	CAP	2000mg/m ²	po	—	2週(DAY1-14)	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	div	120分	DAY1	

※実施決定後より内服開始

div 化学療法前日

<メイン>

18:00-22:00 ①ソルデム3A 500ml / 24

22:00-翌日2:00 ②ソルデム3A 500ml / 240min

翌日2:00-翌日7:00 ③ソルデム3A 500ml / 300min

div 化学療法当日

<メイン>

7:00~ ①5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min

②5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min

③5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min

④NS250ml + トラスツズマブ mg / 90min(1回目)30min(2回目以降)

⑤NS 100ml + アロキシ1V / 30min

⑥NS 250ml + シスプラチン mg / 120min

⑦5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min

⑧5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min

⑨5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min

⑩ソルデム3A 500ml / 240min

⑪ソルデム3A 500ml / 240min

<側管>

③の側管 1)NS 100ml + デキサート1.5V + アロカリス1V / 30min

⑦の側管 2)NS 50ml + フロセミド 1A / 5min

div 化学療法翌日

<メイン>

前日⑪の続き ①ソルデム3A 500ml / 240min

②ソルデム3A 500ml / 240min

<内服薬>

D2から内服 ②デカドロン錠4mg 2錠×3日間

【備考】

1. 化学療法当日、尿量に応じて利尿剤を追加する
2. 翌日退院を想定しているが、患者の状態によっては輸液の追加、退院の延期も可

R8.6.22 改訂

R4.12.2改訂