

癌化学療法輸液約束処方 卵胚1

癌種

卵巣癌(胚細胞腫瘍)

レジメン名

卵胚1 BEP (BLM + CDDP + VP-16)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
ブレオ	ブレオマイシン	BLM	20mg/m2 or 30mg/body	div	30分	DAY 2, 9, 16	21日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	20 mg/m2	div	2時間	DAY 1～5	
ベプシド	エトポシド	VP-16	100 mg/m2	div	2時間	DAY 1～5	

[DAY 1,3,4,5] * フィルターなし

- ① ソルラクト 500ml / 2時間
- ② NS 100ml + * アロキシ1 A + デキサート1V / 30分
- ③ NS 250ml + シスプラチン mg / 2時間
- ④ NS 500ml + エトポシド mg / 2時間
- ⑤ ソリューゲンF 500ml + 8.4%メイロン 2 A / 2時間
- ⑥ ヴィーンD 500ml + 強ミノ 1A + タチオン 200mg / 2時間 (注意)
- ⑦ NS 50ml + フロセミド20mg / 5分

[備考] 5-HT3拮抗薬 *

D1のみアロキシを使用する。

D1～D5は、②投与時イメンドカプセル併用

D1: イメンド125mg内服, D2～D5: イメンド80mg内服

(注意) ソリューゲンFと 8.4%メイロンは投与直前に混注

[DAY 2] * フィルターなし

- ① ソルラクト 500ml / 2時間
- ② NS 100ml + デキサート1V / 30分
- ③ NS 250ml + シスプラチン mg / 2時間
- ④ NS 500ml + エトポシド mg / 2時間
- ⑤ NS 100ml + ブレオ mg / 30分
- ⑥ ソリューゲンF 500ml + 8.4%メイロン 2 A / 2時間 (注意)
- ⑦ ヴィーンD 500ml + 強ミノ 1A + タチオン 200mg / 2時間
- ⑧ NS 50ml + フロセミド20mg / 5分

[DAY 9,16]

- ① ソルラクト 500ml / 2時間
- ② NS 100ml + アロキシ 1 A + デキサート1V / 30分
- ③ NS 100ml + ブレオ mg / 30分
- ④ NS 50ml / 5分

R8.6.22 改訂

R1.11.6改訂