

癌化学療法輸液約束処方 卵胚 2

癌種 卵巣癌(胚細胞腫瘍)
レジメン名 卵胚 2 VeIP (VBL + IFM + CDDP)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
エグザール	ビンブラスチン	VBL	0.11mg/kg	div	30分	DAY 1,2	21日間
イホマイド	イホスファミド	IMF	1200 mg/m2	div	2時間	DAY 1～5	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	20 mg/m2	div	2時間	DAY 1～5	
ウロミテキサン	メスナ	400mg/m2 1日3回		div	30分	DAY 1～5	

[DAY 1,2]

- ① ソルラクト 500ml + 8.4% メイロン 40ml / 2時間
- ② NS 100ml + * アロキシ 1 A + デキサート1V / 30分
- ③ NS 50ml + エグザール mg / 30分
- ④ NS 250ml + イホマイド mg + 8.4% メイロン 40ml / 2時間
- ⑤ NS 250ml + シスプラチン mg / 2時間
- ⑥ ソリューゲンF 500ml + 8.4%メイロン 2 A / 2時間
- ⑦ ヴィーンD 500ml + 強ミノ 1A + タチオン 200mg / 2時間
- ⑧ NS 50ml + フロセミド20mg / 5分

[備考]

1) 5-HT3拮抗薬 *

D1のみアロキシを使用する。

2) ②投与時 イメンド服用 (D1:125mg、D2～5:80mg)

3) メイロンはカルシウムを含む輸液と配合変化あるため、投与直前に混合し
6時間以内に投与すること。(ソルラクト, ソリューゲンF)

[DAY 3,4,5]

- ① ソルラクト 500ml + 8.4% メイロン 40ml / 2時間
- ② NS 100ml + デキサート1V / 30分
- ③ NS 250ml + イホマイド mg + 8.4% メイロン 40ml / 2時間
- ④ NS 250ml + シスプラチン mg / 2時間
- ⑤ ソリューゲンF 500ml + 8.4%メイロン 2 A / 2時間
- ⑥ ヴィーンD 500ml + 強ミノ 1A + タチオン 200mg / 2時間
- ⑦ NS 50ml + フロセミド20mg / 全開

[側管] D1～5

NS 50ml + ウロミテキサン mg / 30分

(イホマイド投与開始時、4時間後、8時間後)

R8.6.22 改訂

H23.8.1作成