

癌化学療法輸液約束処方 卵胚 3

癌種 卵巣癌(胚細胞腫瘍)
レジメン名 卵胚 3 TIP (PTX + IFM + CDDP)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	250mg/m ²	div	24 時間	DAY 1	21日間
イホマイド	イホスファミド	IMF	1500 mg/m ²	div	2時間	DAY 2～5	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25 mg/m ²	div	2時間	DAY 2～5	
ウロミテキサン	メスナ		500mg/m ² 1日3回	div	30分	DAY 2～5	

[D1] *フィルター有り

① NS 100 ml + ファモチジン 1A + デキサート3V / 30分

② NS 100ml + * アロキシ 1 A / 30分

レスタミン5錠内服

③ NS 1000 ml + パクリタキセル mg / 24 hr

☆フィルター使用

[DAY 2～5]

① ソララクト 500ml + 8.4% メイロン 40ml / 2時間

② NS 100ml + デキサート1V / 30分

③ NS 100ml / 30分

④ NS 500ml + イホマイド mg / 2時間

⑤ ソララクト 500ml + ホスホマイシン2g + 8.4% メイロン 40 ml / 2時間

⑥ NS 250ml + シスプラチン mg / 2時間

⑦ ソリューゲンF 500ml + 8.4%メイロン 2 A / 2時間

⑧ ヴィーンD 500ml + ネオファーゲンC 1A + タチオン 1A / 2時間

⑨ NS 50ml + フロセミド20mg / 5分

[備考]

1) 5-HT3拮抗薬*

D1のみアロキシを使用する。

2) DAY1は②投与時: イメンド125mg服用、DAY2～5は③投与時: イメンド80mg服用

3) メイロンはカルシウムを含む輸液と配合変化あるため、投与直前に

混合し、6時間以内に投与すること。(ソララクト、ソリューゲンF)

[側管] D2～5

NS 50ml + ウロミテキサン mg / 30分

(イホマイド投与開始時、4時間後、8時間後)

H26.9.8 改訂

R8.6.22 改訂