疑義照会簡素化プロトコール適応外の薬品組み合わせ一覧表

※生物同等性が異なる剤型のため、プロトコール対象項目②③対象外です。

日本医科大学多摩永山病院薬剤部　令和8年11月作成

販売名/使用可否（各項目別五十音順）	製造販売	添付文書記載内容
使用不可		
カボメティクス錠20mg／カボメティクス錠60mg	武田薬品工業㈱	相互の生物学的同等性は示されていないため、**60mgを投与する際には20mg錠を使用しないこと。**
ケレンディア錠10mg／ケレンディア錠20mg	バイエル薬品㈱	相互の生物学的同等性は示されていないため、**20mgを投与する際には10mg錠を使用しないこと**
コセルゴカプセル10mg／コセルゴカプセル25mg	アレクシオンファーマ合同会社	相互の生物学的同等性は示されていないため、**1回50mgを投与する際には10mgカプセルを使用しないこと。**
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」／ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」	武田テバファーマ㈱	相互の生物学的同等性が示されていないため、250mg錠と500mg錠の互換使用を行わないこと。
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「ＮＩＧ」／ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「ＮＩＧ」	日医工岐阜工場㈱	
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「SN」／ サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」	シオノケミカル㈱	
ゾフルーザ錠10mg／ゾフルーザ錠20mg／ ゾフルーザ顆粒2%分包	塩野義製薬㈱	相互の生物学的同等性は示されていないため、**10mgを投与する際には顆粒2%分包を使用しないこと。** また、**20mg以上の用量を投与する際には、10mg錠を使用しないこと。**
ソホノスカプセル1mg／1.5mg／2mg／2.5mg／5mg／10mg	IPSEN㈱	10mgカプセルとその他の含量のカプセルとの間で生物学的同等性は示されていないため、**20mgを投与する際は10mgカプセル剤2カプセルを使用すること**（また、10mg、12.5mg及び15mgを投与する際は**10mgカプセル剤1カプセルとその他の含量のカプセルを組み合わせて投与すること**
タダラフィル錠10mgCI「FCI」／ タダラフィル錠20mgCI「FCI」	富士化学工業㈱	相互の生物学的同等性は示されていないため、投与量を調節する際には 10mg錠と20mg錠の互換使用を行わないこと。
マヴィレット配合顆粒小児用/マヴィレット配合錠	アッヴィ合同会社	相互の生物学的同等性は示されていないため、互換使用を行わないこと。

メキニスト錠0.5mg／メキニスト錠2mg	ノバルティスファーマ㈱	相互の生物学的同等性は示されていないため、**2mgを投与する際には0.5mg錠を使用しないこと。**

販売名/使用可否（各項目別五十音順）	製造販売	添付文書記載内容
使用不可		
メーゼント錠0.25mg／メーゼント錠2mg	ノバルティスファーマ㈱	相互の生物学的同等性は示されていないため、 **2mgを投与する際には0.25mg錠を使用しないこと。**
リムパーザ錠100mg／リムパーザ錠150mg	アストラゼネカ㈱	相互の生物学的同等性は示されていないため、 **300mgを投与する際には100mg錠を使用しないこと。**
レベスティブ皮下注用3.8mg／ レベスティブ皮下注用0.95mg	武田薬品工業㈱	相互の生物学的同等性試験は実施していないため、互換使用を行わないこと。
血中トラフ濃度を測定して使用		
アフィニトール分散錠2mg／ アフィニトール分散錠3mg	ノバルティスファーマ㈱	分散錠と錠剤の生物学的同等性は示されていない。分散錠と錠剤の切り換えに際しては、切り換えから2週間後を目安に血中トラフ濃度を測定すること。
アフィニトール錠2.5mg／アフィニトール錠5mg		
血中濃度を測定して使用		
プログラフ顆粒0.2mg／プログラフ顆粒1mg	アステラス製薬㈱	顆粒とカプセルの生物学的同等性は検証されていないので、切り換え及び併用に際しては、血中濃度を測定することにより製剤による吸収の変動がないことを確認すること。
プログラフカプセル0.5mg／ プログラフカプセル1mg		